

## Betreuung Nachzucht-Königinnen aus der VSH-Selektion

Von den VSH-Prüfvölkchen werden Nachzuchtköniginnen gezogen und auf Belegstellen begattet.

Die Selektionsentscheidung welche Prüfvölkchen positiv selektiert werden wird etwa Anfang August getroffen. Dann werden ggf. von den positiv selektierten Königinnen nochmal Nachzuchten gemacht und auf Blegstellen begattet oder besamt.

Die Abgabe der Nachzuchten von den positiv selektierten Königinnen erfolgt im August oder bei der späten Nachzucht erst im September / Oktober.

Diese Nachzuchtköniginnen stellen wertvolles Zuchtmaterial dar. Diese müssen in Ableger, Kunstschwärme oder Völker eingeweiselt werden um sicher überwintert zu werden. Dier Varroabehandlung soll nach dem Schadschwellenprinzip erfolgen: siehe unten stehende Tabelle.

Sie dienen im nächsten Jahr als Zuchtmutter und / oder das Völk als Drohnenvolk. Demzufolge ist dafür eine Stockkarte (siehe Rückseite) zu führen.

Königinnen von nicht positiv selektierten Völkern sind ebenfalls belegstellenbegattet und stellen Rasseköniginnen für Wirtschaftsvölker dar.

Imker, die keine Zuchtmutter möchten und das Projekt unterstützen z.B. mit Bienen für Kunstschwärme, Ableger, Aufbau von Varroaspendervölker für die Milbeninfektion, usw., bekommen diese kostenlos zur eigenen Verwendung.

### Handlungsempfehlungen Vitalitätstestvölker nach Handbuch AGT

Gruppe und Empfehlung	% Bienen befall 10.8. KW32	% Bienen befall 31.8. KW 35	% Bienen befall 21.9. KW 38	% Bienen befall 12.10. KW 41
1 Volk nicht gefährdet keine Behandlung !!	< 2	<3	< 4	< 5
2 Volk kritisch in kürzeren Abständen beobachten	2 bis 4	3 bis 6	4 bis 8	5 bis 10
3 Volk sofort behandeln Test nicht bestanden vom Standort entfernen, umweiseln mit Zuchtstoff der Gruppe 1	> 4	> 6	> 8	> 10

Die Feststellung des Milbenbefalls auf den Bienen erfolgt durch die Puderzuckermethode.

Stockkarte für Kastennummer: er:		Königinnummer:		Standort:												Mu	Bemerkung
		Klima		Vitalität			Verhalten				Ertrag			Wabenbau		Varroaschäden	
Datum	Wetter	Temp.	Bienen	Brut	Winterfestigkeit	Sanftmut	Wabenstetigkeit	Schwarmtrieb	Fruchtbarkeit	Frühtracht	Sommertracht	Spättracht	Wirrbau	Propolis	Varroaschäden		
<b>Summe bzw.Mittelwertberechnung</b>																	
<b>Honig in kg Gesamt</b>																	